

Уважаемые родители!

С 18.09.2023 началась вакцинация детей против гриппа вакциной «Совигрипп»

Вакцина «Совигрипп» без консерванта (для детей)

Состав: 1 доза (0,5 мл) содержит:

- Гемагглютинин вируса гриппа подтипа А (H1N1) – 5 мкг
- Гемагглютинин вируса гриппа подтипа А (H3N2) – 5 мкг
- Гемагглютинин вируса гриппа типа В – 11 мкг

Вспомогательные вещества:

- Сополимер 2-метил-5-винилпиридина и N-винилпирролидона² (адьювант) – 500 мкг
- Фосфатно-солевой буферный раствор – до 0,5 мл



Вакцина формирует высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа.

Вакцина является высокоочищенным лекарственным препаратом и хорошо переносится вакцинируемыми.

Возможно развитие следующих реакций:

- местные реакции: болезненность при пальпации, отек и гиперемия кожи в месте введения;
- системные реакции: субфебрильная температура, недомогание, головная боль, першение и боль в горле, легкий насморк.

Указанные местные и системные реакции носят транзиторный характер и исчезают через 1-2 дня без назначения специфической терапии.

Противопоказания для применения.

- Аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины.
- Сильные поствакцинальные реакции на предыдущее введение вакцины гриппозной
- Возраст до 6 мес.

Вакцина особенно показана:

- детям дошкольного возраста, школьникам, лицам старше 60 лет;
- взрослым и детям, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;
- взрослым и детям страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными (кроме аллергии к куриным белкам), хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным.

Способ применения

Детям старше 3 лет, подросткам, взрослым вакцину вводят однократно в прививочной дозе 0,5 мл;

Детям от 6 мес. до 3 лет вакцину вводят двукратно с интервалом 4 недели в прививочной дозе 0,25 мл.

Отсутствие профилактической прививки против гриппа, влечет:

- Развитие осложнений после перенесенного заболевания гриппом и ОРВИ;
- Отказ в приеме в детские оздоровительные учреждения (санаторно-оздоровительные лагеря, посещение Кремлевской елки, детские оздоровительные лагеря Крыма);
- Выезд организованной группой за пределы Республики.